

Ung thư cổ tử cung ở độ tuổi nào thường gặp? Tầm soát ung thư theo độ tuổi

Ung thư cổ dạ con là 1 chứng bệnh thầm lặng và thực trạng đáng báo động là căn bệnh này có thể gặp tại nữ giới đang trong thời kỳ sinh con. Vậy ung thư cổ dạ con tại lứa tuổi nào thường hay gặp? vấn đề định vị rõ độ tuổi thường bắt gặp của ung thư cổ dạ con chủ yếu là bước trước tiên và cấp thiết nhất để chị em phụ nữ chủ động xây dựng lá chắn bảo vệ chính mình.

Ung thư cổ tử cung đứng chính trong các nguyên do gây tử vong tại nữ. Bệnh lý này không thấy đột ngột mà là hiệu quả của quá trình bị nhiễm vi khuẩn HPV kéo dài nhiều năm, phát triển lặng lẽ từ những tổn thương tiền ung thư. Bài văn bài viết này sẽ phân tích cụ thể những nhóm độ tuổi có nguy cơ lớn nhất, giúp cho bạn nắm rõ lộ trình tiến triển của căn bệnh để thì có kế hoạch khám sàng lọc hợp lý.

Ung thư cổ dạ con tại lứa tuổi nào thường gặp?

Không ít người thường hay câu hỏi ung thư cổ dạ con thâm nhập độ tuổi nào không ít nhất. Thực tế, bệnh này không kiểu trừ bất cứ ai tuy vậy liệu có xu hướng chú trọng mạnh đăng nhập các thời kỳ rõ ràng của cuộc đời người nữ. Sau đây là nguy cơ bị bệnh theo từng nhóm tuổi:

[bệnh viện thái hà](#)

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

Dưới 20 tuổi: căn bệnh này cực kỳ thường ít gặp tại những bạn đời dưới 20 độ tuổi, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là ở các trường hợp có "làm chuyện ấy" tình dục quá kịp thời hoặc thiếu các phương pháp bảo vệ an toàn.

- Giai đoạn từ 25 tới 35 tuổi: số lượng ca nhiễm bệnh bắt đầu liệu có dấu hiệu tăng cường bởi vi khuẩn HPV thường hay ủ căn bệnh lặng lẽ trong cơ thể không ít năm trước lúc tiến triển thành ung thư.
- Thời kỳ từ 35 tới 44 tuổi: Theo các số liệu nghiên cứu, hầu hết chị em nhận kết quả phỏng đoán nhiễm bệnh lúc đang tại lứa tuổi này, đây xem là giai đoạn hay gặp nhất.
- Thời kỳ từ 40 đến 55 tuổi: Được xếp truy cập nhóm có nguy cơ cao, nguyên nhân là vì quá trình ứ đọng của không ít yếu tố dẫn tới hại qua thời điểm cao.
- Vừa rồi 65 tuổi: Đừng xem thường lúc đã nhiều tuổi vì thực trạng có hơn 15% số trường hợp bệnh tiếp diễn tại nữ giới Vừa rồi 65 tuổi, hầu hết rơi đăng nhập những người từng lâu không đi thăm khám phụ khoa hay bỏ lỡ vấn đề khám sàng lọc định kỳ.

Ung thư cổ dạ con tại độ tuổi nào thường hay gặp?

Bên cạnh câu hỏi tuổi tác, nên nhớ rằng bị nhiễm vi rút HPV là căn nguyên cốt lõi dẫn tới bệnh tại tất cả mọi người, Bên cạnh đó các nhân tố thí dụ thừa cân, khẩu phần ăn kém khoa học, sử dụng thuốc kháng sinh phòng tránh thai lâu ngày hoặc yếu tố chủng tộc cũng hỗ trợ gây tăng khả năng bị bệnh.

Một số triệu chứng Chia sẻ tới ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ dạ con tại thời kỳ khởi phát diễn tiến vô cùng lặng thầm cũng như hiếm lúc bộc hờ biểu hiện cụ thể. Tuy nhiên, lúc các tế bào ác đặc điểm bắt đầu phát triển mạnh hay lan rộng, người sẽ

thừa đi những tín hiệu báo hiệu cấp thiết mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua. Sau đây là những dấu hiệu đặc trưng Bất mí về căn bệnh này:

Thấy hiện tượng huyết trắng mất cân bằng thất thường, huyết trắng có thể loãng ví dụ nước, đào thải chảy tốn kém hơn hẳn mọi ngày, thỉnh thoảng có lẫn máu cũng như cùng với mùi hôi cực kỳ khó chịu.

- Tiếp diễn tình trạng chảy máu âm đạo không theo những ngày kinh nguyệt, đặc biệt là chảy máu nhanh chóng sau lúc "âm trện" tình dục, xuất huyết giữa các kỳ kinh hoặc bất ngờ chảy máu trở lại Dù bạn đã bước sang giai đoạn tắt kinh.
- Nhận thấy nóng rát, không dễ chịu hay đau buốt sâu ở âm đạo trong cũng như dưới lúc thực hiện hành vi giao hợp tình dục.
- Khắt khe lúc đi đại tiện như là bệnh tiểu buốt, tiểu lắt nhắt, tiểu ra máu.
- Biến đổi tiêu hóa kéo dài, cảm giác đau cùng với xuất huyết trực tràng khi đi vệ sinh vì u bướu chèn ép một số bộ phận xung quanh.
- Cảm nhận một số cơn đau đốn âm ỉ, dai dẳng tại lưng, đau tức chỗ bụng dưới, vùng xương chậu.
- Xuất hiện tình trạng sưng phù tại chân mà không rõ nguyên do chấn thương.
- Tính mệnh thân xác suy nhược đột ngột đối với những triệu chứng đó là mỗi một triển miên, cảm thấy ốm yếu, chán ăn cũng như sụt cân cấp tốc không kiểm chế được.

[da khoa thai ha](#)

[phòng khám 11 thái hà có tốt không](#)

Cảm nhận những cơn đau nhức khu vực bụng sau

Nếu mà nhận thấy người liệu có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào kể Vừa rồi, đặc biệt là một số thất thường về xuất huyết cũng như dịch tiết âm đạo, hãy liên hệ ngay với bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra cũng như kết luận chính xác.

Một số biện pháp kiểm tra ung thư cổ tử cung theo lứa tuổi

Tần suất cùng với biện pháp khám sàng lọc sẽ thay đổi phụ thuộc vào từng thời kỳ cuộc đời cũng như tiền sử sức khỏe của từng người. Lúc đi khám, bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng 1 cái tế bào từ cổ tử cung của bạn. Chiếc này sẽ được xin chào tới để phòng thí nghiệm để tìm sự hiện diện của virus dẫn tới ung thư (xét nghiệm HPV) hoặc soi tìm những tế bào có dáng hình biến đổi thất thường (xét nghiệm Pap).

Cùng với việc sử dụng loại thăm khám, bác sĩ cũng vẫn thực hiện khám phụ khoa tổng quan. Quá trình này bao gồm vấn đề thăm khám kích thước, khu vực của tử cung và buồng trứng, tiếp xúc nắn chỗ bụng cùng với trực tràng để nhận biết các khối u hoặc u nang Nếu mà liệu có. Đó cũng chính là dịp tốt nhất để bạn giải bày đối với bác sĩ về các chứng bệnh lây qua con đường tình dục không giống.

Tần suất cũng như cách kiểm tra sẽ mất cân bằng tùy vào đã thời kỳ

Sau đây là hồ trình khám sàng lọc phù hợp được những doanh nghiệp y học tin cậy khuyến nghị:

Giai đoạn từ 21 đến 29 tuổi

Theo khuyến nghị chung, phụ nữ cần làm thăm khám Pap (hay còn gọi là Pap smear, phết tế bào cổ tử cung) lần đầu khi bước sang tuổi 21. Tần suất hoàn hảo trong giai đoạn này là lặp lại xét nghiệm 3

năm 1 lần. Một lưu ý đặc biệt là bạn ko cần phải khiến cho xét nghiệm này trước năm 21 tuổi, tức thì cả lúc bạn đã từng bắt đầu "yêu" tình dục từ kịp thời.

Giai đoạn từ 30 đến 65 độ tuổi

Đây là khoảng thời gian dài cùng với cần thiết, phải đẹp trong độ tuổi này nhiều lựa chọn linh động hơn để sàng lọc bệnh:

Chọn lựa 1: tiến hành kiểm tra HPV định kỳ 5 năm một lần.

- Chọn lựa 2: thực hiện bộ đôi kiểm tra, phối hợp cả HPV cùng với Pap cộng khi, mỗi 5 năm 1 lần.
- Chọn lựa 3: Chỉ thực hiện xét nghiệm Pap thì cần gây thường xuyên 3 năm 1 lần.

Ngoài ra, những hướng dẫn y khoa mới cập nhật còn đề xuất nữ giới có khả năng bắt mới đầu khám sàng lọc kịp thời hơn, từ năm 25 tuổi đối với thăm khám HPV.

Thời kỳ dưới 65 tuổi

Khi bước qua tuổi 65, việc thì có tiếp tục sàng lọc hay không sẽ tùy thuộc vào lịch sử y khoa của bạn. Hãy chia sẻ thẳng đối với bác sĩ:

Bạn có nguy cơ được tư vấn dừng khám sàng lọc Nếu trong suốt các năm trước kia bạn đã từng đi khám đều đặn cùng với rất hay nhận kết quả bình thường.

- Nếu như những hiệu quả xét nghiệm thời gian gần đây có dấu hiệu nhận biết không bình thường hay trước đó bạn lo là vấn đề đi khám, chuyên gia sẽ cần đến bạn tiếp tục giữ vấn đề khám sàng lọc để đảm bảo an toàn.

Hãy chia sẻ thẳng đối với chuyên gia về việc liệu có tiếp tục tầm soát hoặc không

Câu trả lời dành cho thắc mắc "Ung thư cổ dạ con tại độ tuổi nào thường gặp?" là mầm bệnh có nguy cơ đã bắt mới đầu từ lúc bị nhiễm vi rút HPV và âm thầm tiến triển trong không ít năm. Bởi vậy, tiêm phòng tránh HPV khi còn trẻ cùng với giữ gìn lịch tầm soát định kỳ là một số biện pháp để thực hiện tuy vậy hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cũng như phòng chống ung thư cổ dạ con.